








Programma "LaRAF" - Progetto Rete di Monitoraggio - VITE

BOLLETTINO VITE n. 10 del 18/05/2006 - Provincia di Genova (tecnico di riferimento Dott. Lorenzo Calcagno)

PREVISIONI dal 19/05 al 24/05 su elaborazione del CFMI-PC (ex CMIRL)

Venerdì 19		Sabato 20		Domenica 21		Lunedì 22		Martedì 23		Mercoledì 24	
	Temp =		Temp =		Temp =		Temp =		Temp =		Temp =
Molto nuvoloso. Possibili rovesci in serata.		Variabile. Possibili isolati rovesci.		Variabile. Bassa probabilità di piogge sparse.		Nuvoloso. Possibili deboli piogge.		Nuvoloso. Possibili deboli piogge.		Variabile. Bassa probabilità di deboli piogge sparse.	



FENOLOGIA rilievi effettuati in data 17 maggio 2006			COMMENTO FENOLOGIA	
Area	Vitigno	Stadio fenologico		
Castiglione Chiavarese	Moscato	Grappoli visibili- separati	Dalla tabella emerge molta differenza sul grado di sviluppo fenologico tra l'annata 2005 e quella del 2006. Nonostante il ritardo nell'apertura delle gemme a inizio primavera, le vigne hanno ampiamente recuperato e addirittura anticipato lo sviluppo rispetto al 2005. Nell'entroterra, i germogli presentano grappoli ben formati, contrariamente al 2005 quando i germogli erano a 10 cm di sviluppo. Nel litorale i vigneti monitorati hanno i bottoni fiorali dell'infiorescenza ben sviluppati.	
	Vermentino	Grappoli visibili- separati		
	Dolcetto	Grappoli visibili- separati		
Sestri Levante	Granaccia	Bottoni fiorali		
	Ciliegiolo	Bottoni fiorali		
	Bianchetta	Bottoni fiorali		
	Vermentino	Bottoni fiorali		
Ne Campo di Ne	Bianchetta	Bottoni fiorali		
Ne Zerli	Merlot	Grappoli separati		
Ne Sambuceto	Vermentino	Grappoli separati		
	Ciliegiolo	Grappoli separati		

GESTIONE DEL VIGNETO

PERONOSPORA
Lungo la costa e nei vigneti ben esposti e riparati dell'entroterra, visto l'avvicinarsi della fioritura, si consiglia di fare, entro questa settimana, un trattamento con prodotti endoterapici- preventivi abbinabili al trattamento anti- oidio. I prodotti consigliati sono quelli elencati la scorsa settimana. Di seguito se ne segnalano altri: *fosetil al- cimoxanil, iprovalicarb* - mancozeb - fosetil al; zoxamidone* - mancozeb. *(max 3 trattamenti l'anno).*
Per i viticoltori dell'entroterra che sono più indietro fenologicamente, si consiglia di ritardare il trattamento a metà della prossima settimana.

OIDIO
Nelle zone dove l'incidenza dell'oidio è molto forte si consiglia di intervenire sulle viti con prodotti di sintesi che hanno maggiore persistenza sulla pianta e garantiscono più protezione. Di seguito si segnalano alcuni prodotti che possono essere usati: *Quinoxifen* (Arius, 15 - 25 ml/hl in presenza di germogli già maturati fino all'allegagione); *Azoxistrobin* (quadris, 50 - 75 ml/hl massimo 3 trattamenti l'anno e non più di due consecutivi); *Trifloxystrobin* (Flint, 13 g/hl massimo tre trattamenti all'anno); *Penconazolo* (Topas, 150 - 200 ml/hl massimo tre trattamenti all'anno).
Nelle aree dove la presenza del patogeno non è molto importante si consiglia di intervallare zolfo in polvere al trattamento anti-peronosporico.

Precauzioni importanti per la buona riuscita del trattamento:

- trattare quando le piante sono asciutte;
- attenersi alle dosi dell'etichetta;
- bagnare abbondantemente le piante con la soluzione antiparassitaria;
- se entro 2 ore dal trattamento piove è necessario ripetere l'intervento.

Gli agricoltori interessati al progetto o che hanno problemi fito-sanitari possono telefonare al tecnico della provincia Dott. Calcagno L. il **martedì** o il **giovedì** dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 al numero **348-27.15.158**.