

Glavni preventivni in higienski ukrepi v sadovnjakih:*

- Iz bližine sadovnjaka je potrebno odstraniti gostiteljske rastline, ki so most za prenos okužbe iz okolice v sadovnjak (panešpelje *Cotoneaster*, ognjeni trn *Pyracantha*, fotinja *Photinia davidiana*, glog *Crataegus* in kutina *Cydonia*), na sadjarskih območjih pa saditi namesto teh druge okrasne rastline v 100 m pasu od sadovnjakov.
- Spremljati je potrebno premike čebel v okolici sadovnjakov (do konca junija je premeščanje iz Gorenjske in drugih okuženih območij načeloma prepovedano).
- V času nevarnosti naravnega širjenja okužb je potrebno organizirati vso razpoložljivo delovno silo, da začne sistematično pregledovati nasade.
- Kadar pri delu z rastlinami opazimo sumljiva bolezenska znamenja okužbe, je potrebno delo z rastlinami takoj prekiniti ter razkužiti orodje in roke.
- Kot razkužilo lahko uporabimo 10% raztopino varekine (1 del na 9 delov vode), s katero premažemo rane na drevesu in obrišemo orodje kot so škarje in žage. Ker so varekina in njej podobni pripravki agresivni, se za razkuževanje rok in obutve lahko uporabi 70% alkohol ali komercialna razkužila (npr. pršilo INCIDIN LIQUID).
- Oskrbeti se je potrebno z visokotlačno parno napravo za pranje strojev in opreme za delo v sadovnjakih.
- V okuženih sadovnjakih je potrebno uvesti posebno stroge higienske ukrepe pri gibanju ljudi in strojev (zlasti dezinfekcijske pregrade, redno razkuževanje orodja, obleke in obutve, previdno odstranjevanje okuženih poganjkov in sežig).
- Dokler ni ovržen sum na okužbo sadovnjaka, je treba prekiniti zelena dela, ki povzročajo rane.
- Če je mogoče, je potrebno prilagoditi škropljenje na manjšo porabo vode z manj vetra, zlasti v nasadih, kjer se je okužba že pojavila.
- Ko se pojavi bakterijski izcedek, je potrebno temeljito zatiranje žuželk, ki ga lahko raznašajo.
- Po vsakem neurju, zlasti pa po toči, je priporočljivo za škropljenje uporabiti vsaj bakrov pripravek, da razkužimo rane.
- Okuženih rastlin ali rastlin, za katere sumimo na okužbo, se ne smemo dotikati brez razloga.
- Izrezovanje okuženih socvetij in poganjkov moramo opraviti čim hitreje, toda ob suhem vremenu in ob stalnem razkuževanju orodja.
- Izrezati je potrebno 2 do 3 kratno dolžino prizadetega dela, vendar najmanj 40 do 50 cm v zdrav les in razkužiti tudi rane v lesu.
- Izrezane veje je potrebno previdno izvleči iz krošnje, da se prepreči širjenje okužbe, ali jih izrezati neposredno v vrečo.
- Rastline, s katerih imetnik izrezuje poganjke z vidnimi znamenji, mora trajno označiti in ponovno pregledovati v intenzivnih nasadih vsakih 7 dni, v ostalih pa vsakih 14 dni.
- Okužbo sadovnjaka je potrebno prijaviti lokalnemu kmetijskemu zavodu, fitosanitarnemu inšpektorju ali na dežurni mobilni telefon 041/354-405, da je omogočena strokovna pomoč in laboratorijska potrditev okužbe.

*Ukrepi so predpisani v Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št.