



30. junij 2010

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA ZARADI NEVARNOST IZBRUHOV ZLATE TRSNE RUMENICE

Predvsem na razmejenih območjih obstaja velika nevarnost širjenja karantenske zlate trsne rumenice s pomočjo ameriškega škržatka, zato je tako v **žariščih kot tudi v varnostnih območjih obvezno zatiranje** tega prenašalca. Obvezna so 3 tretiranja.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v pridelovalnih vinogradih ni obvezno, je pa priporočljivo; opravimo 2 tretiranja in sicer prvič takoj po cvetenju, 2. tretiranje pa obenem z zatiranjem 2. generacije groznih sukačev.

V **matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah**, ki morajo biti oddaljeni najmanj 100 m od žarišč okužbe, je **zatiranje ameriškega škržatka obvezno na ozemlju celotne Slovenije**, poleg tega pa je obvezno tudi spremljanje ulova na rumene lepljive plošče. Plošče nastavimo konec junija, okvirno število je 10 plošč na 1 ha veliko parcelo. Opraviti je treba najmanj 3 tretiranja, roki pa so enaki kot v proizvodnih vinogradih. Če se po 3. tretiranju škržatki še ujamejo na plošče, je treba s škropljenji nadaljevati.

Okvirni termini zatiranja ameriškega škržatka v pridelovalnih vinogradih na razmejenem območju in fitofarmacevtska sredstva (natančnejše roke napove opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin)

Termin /Razvojna faza trte	Ameriški škržatek	Sredstvo	Opombe
1. tretiranje sredi junija do konca junija / Konec cvetenja	ličinke L ₂ – L ₃ (2-4 tedne po začetku izleganja)	Steward ¹ Actara ² Pripravki, ki vsebujejo piretrin ³	
2. tretiranje 2-3 tedne po prvem tretiranju oz. do 15. julija	ličinke L ₄ do L ₅ , odrasli škržatki	Reldan ⁴ Pyrinex ⁵ Decis ⁶ Pripravki, ki vsebujejo piretrin	To tretiranje umestimo v optimalni čas za grozdne sukače.
3. tretiranje v prvi dekadi avgusta	odrasli škržatki	Actara Pripravki, ki vsebujejo piretrin	3. tretiranje lahko opustimo, če namestimo rumene lepljive plošče, pa nanje v avgustu ni ulova ameriških škržatkov

Poleg obveznih škropljenj v terminih, ki so navedeni v tabeli, je priporočljivo opraviti tudi predpomladanska tretiranja s sredstvi (ti pripravki niso registrirani za zatiranje ameriškega škržatka):

- Ogriol: v fenofazi C-D zatiramo pršice šiškaričice (Eriophyidae) in rdečo sadno pršico (*Panonychus ulmi*).
- Žvepleno apnena brozga: do fenofaze C-D zatiramo pršico trsne kodravosti (*Calepitrimerus vitis*). Dovoljenje za uporabo ima le do 31.12.2010.
- Thiovit Jet ima na trti dovoljenje za predpomladansko zatiranje pršice trsne kodravosti (*Calepitrimerus vitis*) in trsna pršica (*Colomerus vitis*).

¹ Steward: uporaba je dovoljena za ličinke stadijev od L₁ do L₃

² Actara: dovoljena so 3 tretiranja, najbolj učinkovito je delovanje na ličinke stadijev L₁ do L₃.

³ Pripravki, ki vsebujejo piretrin: Kenyatox verde, Biotip floral, Flora verde, Valentin eko insekticid iz nar. piretrina konc.; primerni so predvsem za ekološko pridelavo.

⁴ Reldan: dovoljeno je 1 tretiranje

⁵ Pyrinex: deluje obenem tudi na grozdne sukače

⁶ Decis: 1 tretiranje je dovoljeno za rodne vinograde in sicer od konca cvetenja do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha; 2 tretiranja sta dovoljena za matične vinograde, matičnjake in trsnice.