

## TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Ker živi ameriški škržatek samo na trti in razvije le en rod na leto, je tudi njegovo zatiranje tehnološko razmeroma enostavno in tudi učinkovito. Zatreti ga je potrebno, preden je možen prenos bolezni z okuženih na neokužene trse, se pravi predvsem v razvojnem stadiju ličinke in nimfe.

Tretiranje zoper odrasle oblike je namenjeno osebkom, ki naknadno priletijo v vinograd ali trsnico.

Ukrep je potrebno izvajati v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah ter v okuženih vinogradih in njihovi okolici na razmejenem območju, kjer je ugotovljena navzočnost zlate trsne rumenice.

Navzočnost odrasle oblike ameriškega škržatka v vinogradu ugotavljamo z rumenimi lepljivimi pastmi (Rebel, Terminator, ipd.). Te izobesimo v vinograd prve dni julija, preden vzletijo prvi odrasli osebki. Ulov ameriškega škržatka kontroliramo (po možnosti tedensko) do konca avgusta, zlasti pa v obdobju do začetka avgusta, ko je še čas za njegovo zatiranje. Vabe menjavamo vsakih 14 dni, ker se sicer njihova učinkovitost zmanjša. Število vab je odvisno od velikosti vinograda. V vinogradih, manjših od 2 hektarov, izobesimo vsaj tri takšne vabe na različna mesta. V večjih vinogradih je priporočljivo izobesiti vsaj eno vabo na vsak hektar vinograda.

Ameriški škržatek meri od 4,8-5,5 mm. Kdor ameriškega škržatka ne pozna ali ga ne pozna dovolj dobro, pošlje ali odnese lepljive ploščice na **Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica**, v potrditev navzočnosti vrste. Zaradi lažjega rokovanja z lepljivimi ploščami te pred pošiljanjem (najbolje že kar na mestu takoj ob zamenjavi) z obeh strani prekrijemo s tanko prozorno kuhinjsko folijo.

### FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA:

Pripravki, ki so registrirani za vinsko trto in delujejo tudi zoper ameriškega škržatka, so:

- klorpirifos (Pyrinex 25 CS)
- klorpirifos-metil (Reldan 22 EC)\*
- deltametrin (DECIS 2,5 EC)
- piretrin (Kenyatox verde)\*\* – predvsem za ekološko pridelavo

\*Uporabljamo ga lahko le 1krat v sezoni

\*\*Uporabljamo ga lahko le 2 krat v sezoni

### ROKI ZATIRANJA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA:

V **proizvodnih vinogradih** na okuženem oziroma razmejenem območju:

1. 2 do 4 tedne po začetku izleganja ličink (Primorska: sredi junija) proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;
2. sočasno z zatiranjem 2. rodu grozdnih sukačev (Primorska: začetek julija) proti nimfam in prvim odraslim škržatkom.

V **matičnih vinogradih** in **matičnjakih** je potrebno izvesti 3 tretiranja in sicer:

1. sredi junija (ko je vinska trta povsem odcvetela) proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;
2. v začetku julija proti nimfam ameriškega škržatka; to je tudi čas zatiranja 2. rodu grozdnih sukačev;
3. konec julija proti odraslim oblikam ameriškega škržatka.

V **trsnicah** se izvede tri tretiranja z namenskimi insekticidi in sicer:

1. konec junija ali v začetku julija proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;
2. v drugi polovici julija proti nimfam in odraslim oblikam ameriškega škržatka;
3. v začetku avgusta proti morebitnim odraslim oblikam ameriškega škržatka, ki priletavajo v trsnico iz vinogradov v okolici.

Natančnejše roke zatiranja napove lokalna opazovalna – napovedovalna služba za varstvo rastlin. Če ni drugače navedeno, se pripravki uporabljajo v odmerkih, kot so navedeni za zatiranje grozdnih sukačev.

**Pred tretiranjem s sredstvi, ki so strupena za čebele, je potrebno odstraniti cvetočo podrast in izvesti druge preventivne ukrepe za varstvo čebel.**